

Anzeige gemäß § 2 Abs. 1 des Epidemiegesetzes 1950

Anlage I

<p>Patient:in (Name, Vorname(n))</p> <p>Geschlecht: weiblich männlich divers</p> <p>Geburtsdatum:</p> <p>Sozialversicherungsnummer:</p> <p>Adresse: Telefonnummer:</p>	<p>Verdacht auf Erkrankung (nicht alle klinischen Kriterien* müssen erfüllt sein)</p> <p>Erkrankung (klinische Kriterien* erfüllt und Laborbestätigung liegt vor)</p> <p>Erkrankungsdatum: Diagnosedatum:</p> <p>Tod Todesdatum:</p> <p>Ausscheider:in</p>	
<p>Affenpocken¹ Exanthem-Beginn: _____</p> <p>Amöbenruhr¹</p> <p>Anthrax/Milzbrand¹</p> <p>Aviäre Influenza / Vogelgrippe (A/H5N1-Infektion)¹</p> <p>Botulismus¹</p> <p>Brucellose²</p> <p>Campylobacteriose¹</p> <p>Chikungunya-Fieber²</p> <p>Cholera¹</p> <p><i>Clostridioides difficile</i>-Infektion, schwere Verlaufsform²</p> <p>Dengue-Fieber² Dengue-Fieber, schwere Verlaufsform</p> <p>Diphtherie² Respiratorische Diphtherie Hautdiphtherie</p> <p>Echinokokkose durch Fuchsbandwurm¹</p> <p>Echinokokkose durch Hundebandwurm¹</p> <p>Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)²</p> <p>Gelbfieber¹</p> <p>invasive <i>Haemophilus influenzae</i>-Erkrankung² Epiglottitis Meningitis Meningitis UND Sepsis Osteomyelitis / septische Arthritis Pneumonie Sepsis</p> <p>Hämorrhagisches Fieber, viral¹; Erreger: _____</p> <p>Hanta-Virus-Infektion²</p> <p>Hepatitis A-Virus Infektion¹</p> <p>Hepatitis B-Virus Infektion¹</p> <p>Hepatitis C-Virus Infektion¹</p> <p>Hepatitis D-Virus Infektion¹</p> <p>Hepatitis E-Virus Infektion¹</p> <p>Lebensmittelbedingte Intoxikation S.aureus B. cereus C. perfringens¹</p> <p>Legionärskrankheit²</p> <p>Lepra¹</p> <p>Leptospirose¹</p> <p>Listeriose¹</p> <p>Malaria²</p> <p>Masern¹ Exanthem-Beginn: _____</p> <p>invasive Meningokokken-Erkrankung² Meningitis Meningitis UND Sepsis Pneumonie Sepsis OHNE Meningitis Andere</p>	<p>MERS-CoV Infektion¹</p> <p>Norovirus-Infektion, lebensmittelbedingt¹</p> <p>Paratyphus¹</p> <p>Pertussis/Keuchhusten²</p> <p>Pest¹</p> <p>Pocken¹</p> <p>Poliomyelitis/Kinderlähmung¹</p> <p>invasive Pneumokokken-Erkrankung² Bakteriämische Pneumonie Meningitis Meningitis UND Sepsis Sepsis Andere</p> <p>Psittakose¹</p> <p>Puerperalfieber¹</p> <p>Rickettsiose durch <i>R. prowazekii</i>¹</p> <p>Röteln² Rötelnembryopathie²</p> <p>Rotavirus-Infektion, lebensmittelbedingt¹</p> <p>Rotz/Malleus¹</p> <p>Rückfallfieber²</p> <p>Salmonellose¹</p> <p>SARS / schweres akutes respiratorisches Syndrom¹</p> <p>SARS-CoV-2-Infektion¹ Antigennachweis RNA-Nachweis</p> <p>Scharlach²</p> <p>Shigellose¹</p> <p>STEC/VTEC-Infektion (Shigatoxin-bildende <i>E.coli</i>)¹ HUS</p> <p>Tollwut/Wutkrankheit¹</p> <p>Tollwutexposition, mögliche; durch Bissverletzung¹</p> <p>Trachom²</p> <p>Transmissible spongiforme Enzephalopathie, human¹</p> <p>Trichinose/Trichinellose²</p> <p>Tularämie¹</p> <p>Typhus abdominalis¹</p> <p>Varizellen-Meningoenzephalitis²</p> <p>West-Nil-Fieber²</p> <p>Yersiniose¹</p> <p>Zika-Virusinfektion² angeborene Zika-Virusinfektion²</p> <p>Sonstige bakterielle lebensmittelbedingte Erkrankung¹</p> <p>Sonstige <i>E. coli</i>-Enteritis (ETEC, EIEC, EPEC, EaggEC), lebensmittelbedingt¹</p> <p>Sonstige invasive bakterielle Erkrankung (Meningitis, Sepsis)²</p> <p>Sonstige virale lebensmittelbedingte Erkrankung¹</p> <p>Sonstige virusbedingte Meningoenzephalitis²</p> <p style="text-align: right;">Angabe des Erregers wenn unter „Sonstige“: _____</p>	
<p>geimpft</p> <p>geimpft, aber Intervall überzogen Anzahl erhaltener Impfdosen: Datum der letzten Impfung: Impfstoff (Produktname):</p> <p>nicht geimpft</p>		
<p>Patient:in ist in medizinischer Einrichtung tätig</p> <p>Patient:in ist in Lebensmittel verarbeitender Einrichtung tätig</p> <p>Patient:in ist in einer Gemeinschaftseinrichtung tätig, z.B. Kindergarten, Schule, Pflegeheim, sonstige Massenunterkünfte</p> <p>Patient:in wird in einer Gemeinschaftseinrichtung / gesundheitsversorgender Einrichtung betreut</p> <p>Auslandsaufenthalt Reiseland: Aufenthaltsperiode: von bis</p>		
<p>Meldende Person ((Ärztin/Arzt, Praxis, Krankenhaus, Adresse, Telefonnummer):</p>	<p>Meldedatum:</p>	<p>An die Bezirksverwaltungsbehörde-Gesundheitsamt:</p>

¹Verdacht, Erkrankung und Tod meldepflichtig; ²Erkrankung und Tod meldepflichtig

*Klinische Kriterien der Surveillance-Falldefinition, u.a. nach Durchführungsbeschluss 2018/945 der EU-Kommission vom 22. Juni 2018; siehe Rückseite. Falls keine klinischen Kriterien angegeben, siehe oben.

Affenpocken

Mindestens zwei der folgenden klinischen Manifestationen:
 (1) Fieber (>38,5°C), Myalgie, Arthralgien, Cephalgie, Rückenschmerzen, schmerzhafte Lymphadenopathie, Fatigue (Prodromalstadium)
 (2) Makulopapulöses oder vesikulopustulöses Exanthem (lokal oder generalisiert), möglicherweise mit Nabelung oder Schorfbildung
 (3) Schmerzhaftes Schleimhautläsionen

Amöbenruhr

Intestinale Amöbose: Mindestens eines der folgenden Symptome: (blutig-schleimiger) Durchfall; Entzündung des Dickdarms
Extraintestinale Amöbose (Amöbenleberabszess): Mindestens eines der folgenden Symptome: Schmerzen im rechten Oberbauch; extraintestinale Abszesse (pathologische Leberparenchymveränderungen)

Anthrax/Milzbrand

Hautmilzbrand, Gastrointestinalmilzbrand, Lungenmilzbrand, Meningitis/Meningoenzephalitis-Milzbrand, septikämischer Milzbrand

Aviäre Influenza/Vogelgrippe

Mindestens eines der folgenden Symptome: Fieber UND Anzeichen und Symptome einer akuten Atemwegsinfektion; Tod durch unerklärliche akute Atemwegserkrankung

Botulismus

Lebensmittel- und Wundbotulismus: Mindestens einer der beiden Symptome: beidseitige Schädigung der Hirnnerven (z. B. Diplopie, verschwommene Sicht, Dysphagie, bulbäre Schwäche); periphere symmetrische Lähmung
Botulismus bei Kleinkindern: Jedes Kleinkind mit mindestens einem der folgenden Symptome: Verstopfung; Lethargie; Stillprobleme; Ptosis; Dysphagie; allgemeine Muskelschwäche

Brucellose

Fieber UND mindestens eines der folgenden Symptome: Schweißausbrüche (profus, übelriechend, vor allem nachts); Schüttelfrost; Arthralgie; Schwächegefühl; Depression; Kopfschmerzen; Anorexie

Campylobacteriose

Mind. 1 d. folgenden Symptome: Durchfall; Bauchschmerzen; Fieber

Chikungunya-Fieber

Akuter Fieberbeginn >38,5°C UND schwere Arthralgie, die nicht durch eine andere Krankheit erklärt werden kann

Cholera

Mindestens eines der folgenden Symptome: Durchfall; Erbrechen

Clostridioides difficile-Infektion (CDI), schwere Verlaufsform

Mindestens eines der drei folgenden Kriterien:
 Aufnahme/Verlegung auf eine Intensivstation aufgrund einer CDI oder ihrer Komplikationen; Durchführung eines chirurgischen Eingriffs (z.B. Kolektomie) aufgrund eines Megakolons, Darmpferration od. Therapie-refraktären Kolitis; Tod innerhalb von 10 Tagen nach Diagnosestellung einer CDI und Wertung der CDI als direkte Todesursache oder als zum Tode beitragende Erkrankung

Dengue-Fieber

Eine der 3 klinischen Manifestationen: Fieber (*Denguefieber*); schwere Verlaufsform: Fieber UND hämorrhagische Verlaufsform (*hämorrhagisches Denguefieber*); Fieber UND hämorrhagische Verlaufsform UND Herz-/Kreislaufversagen (*Dengue-Schock-Syndrom*)

Diphtherie

Mindestens eine der folgenden klinischen Manifestationen:
Klassische respiratorische Diphtherie: Erkrankung der oberen Atemwege mit Laryngitis/Nasopharyngitis/Tonsillitis UND eine adhärenente Membran/Pseudomembran;
Milde respiratorische Diphtherie: Erkrankung der oberen Atemwege mit Laryngitis/Nasopharyngitis/Tonsillitis ohne adhärenente Membran/Pseudomembran;
Hautdiphtherie: Hautläsion;
Sonstige Diphtherie: Läsion der Augenbindehaut oder der Schleimhäute

Echinokokkose/Hundebandwurm/Fuchsbandwurm

Klinische Kriterien für Überwachungszwecke irrelevant

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)

Symptome eines entzündeten ZNS, z.B. Meningitis; Meningoenzephalitis; Enzephalomyelitis; Enzephaloradikulitis

Gelbfieber

Fieber UND mindestens einer der beiden folgenden Symptome: Gelbsucht, generalisierte Blutungen

Invasive Haemophilus influenzae-Erkrankung

Hämorrhagisches Fieber, viral (Ebola, Krim-Kongo-, Marburg-, Lassa-Fieber und andere):

Gegenwärtig od. vor dem Ableben folgende Symptome: Fieber ≥ 38,6°C UND zumindest eines der folgenden Symptome: Starke Kopfschmerzen; Pharyngitis; Erbrechen; Durchfall; Bauchschmerzen; Blutungen; Multi-Organversagen ODER plötzlicher und unerklärlicher Tod

Hanta-Virus-Infektion

Mindestens eines der folgenden klinischen Manifestationen:

- (1) Fieber;
 - (2) hämorrhagische Verlaufsform (*Hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom* (HFRS));
 - (3) Nierenfunktionsstörung;
 - (4) mindestens zwei der folgenden Symptome: Durchfall; Dyspnoe; Herz-/Kreislaufversagen; (Hantavirus-induziertes kardio-pulmonales Syndrom (HCPS)); Husten; Lungeninfiltrate
- www.ris.bka.gv.at

(Hantavirus-induziertes pulmonales Syndrom (HPS);

Kopfschmerzen; Muskel-, Glieder- oder Rückenschmerzen; neu aufgetretene Myopie („Verschwommensehen“); Übelkeit oder Erbrechen

Hepatitis, akut – gilt für HAV-, HBV-, HCV-, HDV-, HEV-Infektion

Symptome wie Müdigkeit; Bauchschmerzen; Appetitverlust; zeitweilige Übelkeit und Erbrechen) UND mindestens eines der folgenden Symptome: Fieber; Gelbsucht; erhöhte Serum-Aminotransferase-Aktivität

Hepatitis, chronisch – gilt für HBV-, HCV-, HDV-Infektion

Klinische Kriterien für Überwachungszwecke irrelevant

Legionärskrankheit

Radiologische/ klinische Pneumonie

Lepra

Mindestens eine der vier folgenden klinischen Manifestationen:
Indeterminierte Lepra: Einzelne, hypopigmentierte, makulöse (fleckige) Hautläsionen
Tuberkuloide Lepra: Vorliegen der beiden folgenden Symptome: einzelne, abgegrenzte, dyspigmentierte, am Rande papulös erhabene, sensibilitätsgestörte Hautareale; verdickte periphere Hautnerven
Lepromatöse Lepra: Definiert als Vorliegen einer der beiden folgenden Symptome: zahlreiche beidseitig, symmetrisch angeordnete makulopapulöse (fleckig-erhabene) Läsionen der Haut oder Schleimhaut der oberen Atemwege; knotig-flächenhafte Hautinfiltrationen

Borderline Lepra: Mindestens je eines der Symptome der tuberkuloiden und lepromatösen Form

Leptospirose

Fieber ODER mindestens zwei der folgenden Symptome: Schüttelfrost; Kopfschmerzen; Myalgie; Bindehautsuffusion; Haut- und Schleimhauteinblutungen; Exanthem; Gelbsucht; Myokarditis; Meningitis; Nierenfunktionsstörung; Hämoptysen

Listeriose

Mindestens eines der folgenden Symptome: Fieber; Meningitis oder Meningoenzephalitis oder Enzephalitis; grippeähnliche Symptome; Sepsis; lokalisierte Infektionen wie Arthritis, Endokarditis, Endophthalmitis, Abszesse
Listeriose in der Schwangerschaft: Spontanabort; Fehlgeburt; Totgeburt (fötaler Tod nach 20. SSW); Frühgeburt (vor 37. SSW)
Neugeborenen-Listeriose: mindestens eines der folgenden Symptome im ersten Lebensmonat: Meningitis oder Meningoenzephalitis; Sepsis; Dyspnoe; Granulomatosis infantiseptica; Haut-, Schleimhaut- oder Bindehautläsionen

Malaria

Fieber ODER Fieber in der Anamnese.

Masern

Fieber UND makulopapulöses Exanthem UND mindestens eines der folgenden Symptome: Husten, Schnupfen, Konjunktivitis

MERS-CoV Infektion

Akutes respiratorisches Syndrom (mit oder ohne Fieber, mit oder ohne Husten), bei dem basierend auf klinischen, radiologischen od. histopathologischen Hinweisen auf ein entzündliches Infiltrat der Verdacht besteht, dass die unteren Atemwege betroffen sind (z.B. Pneumonie oder akutes Atemnotsyndrom)

Norovirus-Infektion, lebensmittelbedingt

Mindestens eines der folgenden Symptome: Durchfall; Erbrechen

Pertussis/Keuchhusten

Mindestens zwei Wochen anhaltender Husten UND mindestens eines der folgenden Symptome: Hustenanfälle; Keuchen beim Einatmen; posttussives Erbrechen ODER ärztliche Keuchhusten-Diagnose ODER Apnoe-Episoden bei Kleinkindern

Pest

Mindestens einer der folgenden klinischen Manifestationen:
Beulenpest: Fieber UND plötzliches Auftreten schmerzhafter Lymphadenitis;
Pestsepsis: Fieber
Lungenpest: Fieber UND mindestens eines der folgenden Symptome: Husten; Brustschmerzen; Hämoptysen

Pocken

Fieber UND Bläschen oder feste Pusteln im gleichen Entwicklungsstadium mit zentrifugaler Verteilung ODER Fieber UND atypisches Erscheinungsbild (mindestens eines der folgenden Symptome: hämorrhagische Läsionen; flache samtige Läsionen, die nicht zu Bläschen fortschreiten; Variola sine eruptione; milderer Typ)

Poliomyelitis/Kinderlähmung

Akute schlaffe Parese < 15a ODER sonstiger Polioverdacht

Psittakose

Mindestens eines der folgenden Kriterien: Pneumonie; Endo- oder Myokarditis oder mindestens zwei der fünf folgenden Symptome: Fieber, Hepatosplenomegalie, Hepatitiszeichen, Husten, Kopfschmerzen

Rickettsiose

Fieber

Röteln

Plötzliches Auftreten eines generalisierten makulopapulösen Exanthems UND mindestens einer der folgenden Symptome: zervikale Adenopathie; subokzipitale Adenopathie; postaurikuläre Adenopathie; Arthralgie; Arthritis

Rötelnembryopathie (CRS)

Jedes Kleinkind unter 1a oder jedes Totgeborene mit mindestens zwei der unter Kategorie A angeführten Befunde ODER einem Befund der Kategorie A und einem der Kategorie B:
Kategorie A: Katarakt(e); angeborenes Glaukom; angeborene

Herzkrankheit; Gehörverlust; Retinopathia pigmentosa

Kategorie B: Purpura; Splenomegalie; Mikrozephalie; Entwicklungsverzögerung; Meningoenzephalitis; Atrophie der Knochen mit vermehrter Strahlendurchlässigkeit; Gelbsucht innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt

Rotavirus-Infektion, lebensmittelbedingt

Mindestens eines der folgenden Symptome: Durchfall; Erbrechen

Rotz/Malleus

Mindestens eines der folgenden Symptome: Appetitlosigkeit; Fieber mit Schüttelfrost; Myalgien/Athralgien in Kopf und Brust; Nasensekretion; Lichtempfindlichkeit

Rückfallfieber

Fieber

Salmonellose

Mindestens eines der folgenden Symptome: Durchfall; Fieber; Bauchschmerzen; Erbrechen

SARS

Akutes Fieber oder Fieber in der Anamnese UND mindestens eines der folgenden Symptome: Husten; Atembeschwerden; Kurzatmigkeit UND mindestens einem der folgenden Befunde: radiologischer Pneumonie-Nachweis; radiologischer Nachweis des akuten respiratorischen Distress-Syndroms; Autopsiebefund Pneumonie; Autopsiebefund des akuten respiratorischen Distress-Syndroms UND Fehlen einer alternativen Diagnose

SARS-CoV-2-Infektion

Mindestens eines der folgenden Symptome: Husten, Fieber, Kurzatmigkeit, plötzliches Auftreten einer Störung bzw. Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns

Scharlach

Mindestens eines der folgenden Symptome: Pharyngitis; Impetigo/Pyodermie; Wundinfektion; septisches Krankheitsbild UND fleckiges Exanthem (makulopapulös) UND mindestens eines der folgenden Symptome: fleckiges Exanthem am weichen Gaumen; Himbeer- oder Erdbeerzunge; Abschuppen der Haut bei Abheilung des Exanthems unter Betonung der palmoplantaren Bereiche

Shigellose

Mindestens eines der folgenden Symptome: Durchfall; Fieber; Erbrechen; Bauchschmerzen

STEC/VTEC-Infektion

Mindestens eines der folgenden Symptome: Durchfall; Bauchschmerzen. HUS: akutes Nierenversagen UND mikroangiopathische hämolytische Anämie UND/oder Thrombozytopenie

Tollwut/Wutkrankheit

Akute Enzephalomyelitis UND mindestens zwei der folgenden Symptome: sensorische Veränderungen im Zusammenhang mit einem Tierbiss an der Bissstelle; Parese oder Paralyse; Krämpfe der Schluckmuskeln; Hydrophobie; Delirium; Krämpfe; Angstzustände

Trachom/ägyptische Körnerkrankheit

Klinische Zeichen einer folliculären Konjunktivitis (Akutphase), Entropium und Trichiasis (Spätstadium)

Transmissible spongiforme Enzephalopathien, human

sCJD, gCJD, erworbene CJD

Trichinose/Trichinellose

Mindestens drei der folgenden Symptome: Fieber; Muskelschmerzen; Durchfall; Gesichtsoedem; Eosinophilie, subkonjunktivale, subunguale und retinale Blutungen

Tularämie

Mindestens eine der folgenden klinischen Manifestationen:
Ulceroglanduläre Tularämie: kutaner Ulkus UND regionale Lymphadenopathie
Glanduläre Tularämie: vergrößerte und schmerzhafte Lymphknoten ohne erkennbaren Ulkus
Okuloglanduläre Tularämie: Konjunktivitis UND regionale Lymphadenopathie
Oropharyngeale Tularämie: zervikale Lymphadenopathie UND mind. einer der folgenden Befunde: Stomatitis; Pharyngitis; Tonsillitis

Intestinale Tularämie: mindestens eines der folgenden Symptome: Bauchschmerzen; Erbrechen; Durchfall

Pulmonäre Tularämie: Pneumonie

Typhoidale Tularämie: mind. eines der folgenden Symptome: Fieber ohne frühe Lokalisierungszeichen und -symptome; Sepsis

Typhus/Paratyphus

Anhaltendes Fieber ODER Fieber mindestens zwei der folgenden Symptome: Kopfschmerzen; relative Bradykardie; Husten ohne Auswurf; Durchfall; Verstopfung; Unwohlsein oder Bauchschmerzen

West-Nil-Fieber

Mindestens eines der folgenden Symptome: Fieber, Enzephalitis, Meningitis. Bei asymptomatischer Infektion klinische Kriterien irrelevant

Yersiniose

Mindestens eines der folgenden Symptome: Fieber; Durchfall; Erbrechen; Bauchschmerzen (Pseudoappendizitis); Stuhlzwang

Zika-Virusinfektion

Hautausschlag UND eines der folgenden Symptome: Fieber, makulopapulöser Hautausschlag, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Konjunktivitis, GBS

Angeborene Zika-Virusinfektion

Mikrozephalie, intrazerebrale Verkalkungen, sonstige Störungen des ZNS bei Föten oder Neugeborenen

